


3 糖尿病

1. 「糖尿病が強く疑われる者」の状況



資料：厚生労働省 平成27年 国民健康・栄養調査

2. 「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況

		(%)						
		総数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
総数	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	糖尿病が強く疑われる者	12.2	0.0	0.9	2.5	8.1	16.4	19.4
	(再掲) 糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者 [※]	55.1	0.0	66.7	72.7	66.7	43.7	59.5
	糖尿病の可能性が否定できない者	12.3	1.5	3.4	8.5	9.7	14.4	17.3
	上記以外	75.5	98.5	95.6	89.0	82.2	69.2	63.3
男性	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	糖尿病が強く疑われる者	15.5	0.0	0.0	3.8	10.6	20.1	22.3
	(再掲) 糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者 [※]	59.5	0.0	0.0	100.0	73.9	46.4	64.0
	糖尿病の可能性が否定できない者	11.3	2.0	1.9	10.0	8.3	11.7	15.4
	上記以外	73.3	98.0	98.1	86.3	81.1	68.2	62.3
女性	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	糖尿病が強く疑われる者	9.8	0.0	1.4	1.8	6.5	13.3	17.0
	(再掲) 糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者 [※]	50.0	0.0	66.7	40.0	59.1	40.3	54.5
	糖尿病の可能性が否定できない者	13.1	1.2	4.2	7.6	10.6	16.6	18.9
	上記以外	77.1	98.8	94.3	90.6	82.9	70.1	64.1

資料：厚生労働省 平成26年 国民健康・栄養調査

※「服薬者」とは、身体状況調査票で「インスリン注射または血糖を下げる薬」の使用有と回答した者。

「糖尿病が強く疑われる者」の判定
 ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c (NGSP) の値が6.5%以上、または、身体状況調査票の(7)「現在、糖尿病治療の有無」に「1 有」と回答した者
 「糖尿病の可能性を否定できない者」の判定
 ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c (NGSP) の値が6.0%以上、6.5%未満で、「糖尿病が強く疑われる者」以外の者